AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-5-9-77142916

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE
CPPAP N° 523 AD

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

ABONNEMENT ANNUEL 50 F

Régisseur de recettes D.D.A.
2, rue des Mineurs
67070 STRASBOURG CEDEX

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX
Tél. (88) 61.49.50 Poste 454

Imprimerie de la Station ALSACE et LORRAINE - Directeur-Gérant: P. JOURNET

Bulletin n° 139 — 2 septembre 1977

GRANDES CULTURES

- HOUBLON -

MILDIOU

Dans les houblonnières où la récolte est prévue après le 8 septembre, renouveler la protection contre cette maladie. Apporter beaucoup de soin à cette application, en veillant notamment à bien protéger les cônes de l'extrémité des lianes de houblon.

OIDIUM

Les conditions climatiques de ces derniers jours (brouillards matinaux, temps lourd...) sont favorables au développement de ce champignon dont la présence sur cônes est de plus en plus fréquente.

Ajouter un anti-oïdium à la bouillie anti-mildiou. Apporter, dans l'état actuel de la végétation, 2 000 à 3 000 litres de bouillie à l'hectare.

PUCERONS

Suivre l'évolution de ces ravageurs et intervenir si nécessaire dans les houblonnières devant être récoltées tardivement. Pour le choix de l'aphicide, tenir compte des délais d'emploi des produits avant la récolte.

- POMMES DE TERRE -

(Cultures d'altitude - variétés tardives)

MILDIOU

Un dernier traitement fongicide est conseillé sur les variétés tardives implantées dans les zones d'altitude pour lesquelles on désire encore prolonger la végétation. En cas d'installation rapide de la maladie, procéder sans attendre aux opérations de défanage.

- BETTERAVES INDUSTRIELLES -

CERCOSPORIOSE, OIDIUM

Les rosées matinales sont favorables au développement des foyers de cercosporiose dans les parcelles non encore protégées ; aussi, les conseils émis dans notre bulletin n° 138 du 23 août demeurent valables.

P58

.../...

A noter que les produits utilisables pour limiter ces foyers de cercosporiose, ainsi que le soufre mouillable à 7,5 kg de m. a./ha sont efficaces pour limiter la progression éventuelle de l'oïdium provoquant un feutrage blanc sur le feuillage des betteraves.

- TABAC -

MILDIOU

A signaler l'accroissement du nombre de parcelles de tabac atteintes par le mildiou en Alsace. Au 30 août, 38 parcelles totalisant 23,87 ha étaient contaminées. Aussi, il est recommandé d'écimer rapidement les parcelles tardives et d'achever de toute urgence la cueillette des feuilles.

CULTURES MARAICHERES

- POIREAU -

TEIGNE

Avec le retour d'un temps chaud, le vol des papillons s'est légèrement intensifié ces derniers jours. Renouveler le traitement insecticide, notamment sur les plantations de poireaux d'hiver. Pour le choix du produit, consulter notre bulletin n° 127 du 8 juin 1977. Tenir compte des délais d'emploi avant la récolte.

- CELERI -

SEPTORIOSE

A la faveur des dernières précipitations ainsi que des rosées matinales, ce champignon risque d'évoluer rapidement. Renouveler la protection des cultures dans les meilleurs délais.

- TOMATE -

MILDIOU

Les attaques de mildiou ont tendance à se développer sur les cultures de plein air. Il est donc nécessaire de continuer la lutte. Utiliser l'un des produits conseillés dans notre bulletin n° 130 du 22 juin 1977. Bien mouiller l'ensemble de la végétation.

CULTURES FLORALES

- CHRYSANTHEME -

ROUILLE BLANCHE ET ROUILLE BRUNE

En traitement préventif contre la rouille blanche et la rouille brune du chrysanthème (provoquant toutes deux des taches de 2 à 5 mm sur les feuilles ainsi que leur dessèchement), il est conseillé d'utiliser l'un des produits suivants :

- manèbe : 160 g de m. a./hl
- mancozèbe : 160 g de m. a./hl
- zinèbe : 200 g de m. a./hl.

En traitement curatif, contre la rouille blanche plus particulièrement, utiliser de préférence un produit à base de triforine (Funginex) ou d'oxycarboxine (Plantvax) à raison de 30 g de m. a./hl.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE et LORRAINE"
J. HARRANGER